



INFORME MES DICIEMBRE CONVENIO 2024

Nombre:	SEBASTIAN PEREZ OLMEDO
Unidad Operativa:	PRODESAL LITUECHE 1
Nº de Visitas Programadas:	29
Nº de Visitas realizadas:	29

Durante el mes de diciembre se realizaron las siguientes actividades

1.- Asesoría Ganaderas

OBJETIVO DE LA VISITA:

Visita a los usuarios para realizar recomendaciones en periodo de encaste y selección de ovinos. Se recomienda realizar una revisión de todos sus animales unos 15 días antes de la fecha presupuestada de encaste, para poder así detectar algún animal con alguna anomalía en ellos y poder descartarlo a tiempo.

Fijarse en los siguientes aspectos.

➤ Revisión de macho reproductor (carnero)

- 1.- Conformación de aplomos y patas; fijándose en la presencia o no, de cojeras.
- 2.- Revisar órganos de la visión y olfato, por si existe alguna anomalía.
- 3.- Revisión del aparato reproductor (testículos normales deben estar blandos y elásticos. Tamaño deben ser de similar tamaño)
- 4.- fijarse en la presencia del pelillo (apéndice veriforme o piliforme)
- 5.- Se recomienda el recambio del carnero, cada 3 años de trabajo. Y no dejar carnerillos de su misma producción.
- 6.- Se recomienda el ingreso de los carneros unos 15 días antes, de la fecha presupuestada del inicio del encaste para que exista un periodo de aclimatación, y las hembras comenzarán a ciclar.

➤ Con respecto a las hembras reproductoras:

- 1.- revisar dentadura para determinar la edad y problemas de prognatismo y braquignatismo
- 2.- Eliminar aquellas que poseen más de 5 partos.
- 3.- Eliminar aquellas que tengan problemas en las ubres (mastitis)
- 4.- Aquellas ovejas secas.
- 5.- Las que hayan sufrido problemas de prolapso.
- 6.- Realizar una revisión de visión, olfato por si hay alguna anomalía.
- 7.- No encastar borregas de menos de 45 kilos de peso vivo, dejar que se desarrollen potrero destinado para ellas, para un mejor desarrollo. descartar las que tengan pezones supernumerarios.
- 8.- descartar animales con alteraciones en la columna.
- 9.- Medir la condición corporal; siendo la ideal, de 3 a 3,5. Realizar FLUSHING en ovejas y carnero con una condición corporal más baja.
- 10.-destinar un potrero pequeño de encaste, para un mejor trabajo del carnero y tener unas pariciones en una misma fecha.

LISTADOS DE USUARIOS VISITADOS

Nº	USUARIO	SECTOR	RUBRO	FECHA
1	Armando González Lisboa.		Ganadería	04/12/2024
2	Ana Lisboa Ponce.		Ganadería	04/12/2024
3	Nino Lisboa Ponce.		Ganadería	04/12/2024
4	Jorge Lisboa Lisboa.		Autoconsumo.	04/12/2024
5	Bernardo Arellano Vidal.		Ganadería	05/12/2024
6	Priscila Muñoz Ramírez.		Autoconsumo.	05/12/2024
7	María Flores Cornejo.		Ganadería	05/12/2024
8	Pilar Fuentes Miranda.		Ganadería	11/12/2024
9	Robelinda Acuña Guerrero.		Ganadería	16/12/2024
10	Benedicta Pastrian Escobar.		Ganadería	16/12/2024



2.- Asesoría en ganadería bovina.

Se visita a los usuarios del rubro principal ganadería bovina, para entregar recomendaciones para el control de la mosca de los cuernos, la cual está presente en este periodo en los animales la cual genera pérdida económica a los usuarios por pérdida de peso de los animales.

Se les recomienda la utilización de algún antiparasitario externo, para ser administrado en el control de la mosca.

Productos recomendados:

1.- MOSKIMIC FORTE: Con una dosis de 10 ml/ animal, siendo administrado de la cruz del animal, hasta la cola. Periodo de resguardo, carne: 0 días y leche: 2 días.

2.- COMMANDER 20/20: con dosis de 10 ml / animal. Administrar a bovino para el control de las mosca de los cuernos y piojos. Resguardo, leche 2 días y carne: 0.

3.- CHEMIE-FLY: antiparasitario externo con una dosis de 10 ml/ 400 kilos de peso vivo. Para el control de la mosca de los cuernos y piojos.

Periodo de resguardo de 15 días para carne.

Cualquier producto utilizado hay que repetir la dosis a los 35 días.

Nº	USUARIO	SECTOR	RUBRO	FECHA
1	Eliana Palma Osorio.		Ganadería Bovina	05/12/2024
2	José Navarro Fredes.		Ganadería Bovina	13/12/2024

3.- Asesoría en apicultura.

Se visita a los usuarios del rubro apícola para entregar recomendaciones en manejo, postura de alza y control preventivo de la avispa chaqueta amarilla.

- Manejo y postura de alza.
 - Utilizar un alza limpia flameada para prevenir hongos.
 - Marcos en buen estado, bien alambrados estirados.
 - Lo ideal utilizar cera estirada para disminuir el trabajo de las abejas.
 - Instalar alza cuando la cámara de cría ya no tenga el suficiente espacio.
 - Para incentivar la subida de las abejas al alza, se deben tomar los marcos 1-10, subir al alza en posición 4-6, los marcos vacíos en posición 3-8 en la cámara de cría.
 - Siempre tratar de subir los marcos más oscuros al alza, para posteriormente fundirlos y limpiarlos.
- Control de avispa chaqueta amarilla.
 - Se recomienda utilizar un cebo VESPUGARD, que puede ser instalado lo más cercano del apiario colgado en un árbol.
 - Otro control puede ser con una botella con lavazas detergente con un trozo de carne.
- Nota: Se recomienda cosechar la miel cuando los marcos estén con un 80 % de la miel operculada, para evitar fermentación de la miel.
Usuarios visitados.

Nº	USUARIO	SECTOR	RUBRO	FECHA
1	Matías González Cabello	Quelentaro	Apícola	03/12/2024
2	Luis Torres Gutiérrez	Santa Mónica.	Apícola	05/12/2024
3	Horacio Olivares Vidal	Cartagena	Apícola	09/12/2024

4. Asesoría en flores.

4.1.- se visita a la usuaria para entregar recomendaciones en producción de flores en invernadero.

Usuaría cuenta con 2 invernaderos en los cuales cuenta con (claveles, astromelias.), se realizó un monitoreo recomendando lo siguiente:

➤ Claveles:

- Realizar un control de trips de las flores producto recomendado:
KARATE ZEON: dosis de 50 cc por 50 litro de agua.
(aplicar cada 20 días).
- Realizar desbrote de botones, dejar 1 solo botón por vara, para ayudar al desarrollo.
- Pauta de fertilización:

Vía riego:

ULTRASOL INICIAL: 3 kilos – lunes.

NITRATO DE CALCIO: 2 kilos – miércoles.

UREA: 2 kilos – viernes.

(aplicar cada 10 días)

Vía foliar:

TERRA SORB FOLIAR: dosis de 100 cc por 50 litros de agua.

(aplicar cada 10 días).

➤ Astromelias:

- Realizar un buen alambrado de las astromelias para ayudar al desarrollo vegetativo de estas.
- Mantener una buena pauta de fertilización para estimular al desarrollo.

Vía riego:

ULTRASOL INICIAL: 2 kilos – lunes.

UREA: 1 kilo – miércoles.

NITRATO DE CALCIO: 1 kilo – viernes.

(aplicar en 200 litros de agua cada 10 días.)

- Mantener una buena ventilación todos los días, levantar todos los días las cortinas de las 9° AM.

- NOTA: realizar un control de hongos (PHYTOPHTHORA) vía riego – foliar cada 30 días. Producto recomendado:

ALIETTE 80 WP: 250 gramos por 100 litros de agua.

Nº	USUARIO	SECTOR	RUBRO	FECHA
1	Rosa Velásquez Devia.		lores.	03/12/2024

5.- Asesorías en hortalizas.

5.1.- se visita al usuario para entregar recomendaciones en producción de hortalizas en invernadero y al aire libre.

Usuario cuenta con una plantación de tomates, lechugas y cebollas, se realizó un monitoreo en ellos recomendando lo siguiente:

- Realizar lo antes posible un control de la polilla del tomate producto recomendado: KATARTE ZEON: dosis de 15 cc por 15 litros de agua.
- Realizar otro control preventivo del tizón del tomate producto recomendado: METALAXIL: dosis de 30 gramos por 15 litros de agua.
- Para mejorar cuajado y engorde de tomates aplicar vía foliar. MAXIFRUT O FRUTALIV: 45 cc por 15 litros de agua.
- Sacar a la venta todas las lechugas que están con un buen desarrollo vegetativo.
- Realizar un control de trips en las cebollas producto recomendado: KARATE ZEON: dosis de 15 cc por 15 litros de agua.
- Desmalezar manual para prevenir plagas y enfermedades.
- Mantener un riego moderado para prevenir problemas de hongos.
- Ventilar todos los días el invernadero, levantar las cortinas todos los días temprano de las 9° AM.
- Se recomienda instalar lo más pronto posible el estanque de agua de 10.000 litros de agua.
- Fabricar una base de cemento bien nivelada.
- Instalar una salida de estanque de 1 pulgada con llave de paso.
- Mantener siempre el estanque bien lleno con agua.

Nº	USUARIO	SECTOR	RUBRO	FECHA
1	Luis González González.	Quelentaro.	Autoconsumo	03/12/2024

5.2.- Se visita al usuario para entregar recomendaciones en plantación de cebollas al aire libre. Usuario cuenta con una plantación de cebollas con una cantidad de 2000 plantas, se realizó un monitoreo recomendando lo siguiente:

- Realizar un control preventivo de mildiu (polvillo), producto recomendado: METALXIL: dosis de 30 gramos por 15 litros de agua. (7 días de carencia) (realizar un buen mojado de la planta)
- Realizar un control preventivo de trips de las cebollas, producto recomendado: KARATE ZEON: dosis de 15 cc por 15 litros de agua.
- Puede fertilizar con una manito de UREA a chorro continuo después del riego.
- Realizar una buena aporca para ir desmalezando manualmente.
- Para estimular su desarrollo vegetativo puede aplicar vía foliar. ZOBERAMINOL PLUS FOLIAR: dosis de 45 cc por 15 litros de agua. (puede aplicar cada 10- 15 días).
TRAINER: dosis de 75 cc por 15 litros de agua. (aplicar cada 15 días).

Nº	USUARIO	SECTOR	RUBRO	FECHA
1	José Vidal Matus.		Hortalizas.	10/12/2024

5.3.- Se visita al usuario para entregar recomendaciones en siembra de maíz choclero. Usuario cuenta con una siembra de maíz choclero, con una superficie de 500 metros cuadrados, 31 surco, se realizó un monitoreo recomendado lo siguiente:

- Fabricar un buen sistema de riego tecnificado con cinta de riego con goteros integrados, 10 – 15 centímetros.
- Colocar a cada chicote una llave de paso para poder regular la presión de agua.
- Colocar gromit de riego para prevenir pérdida de agua.
- Instalar un filtro de malla, para prevenir que la cinta pueda taparse.
- Realizar un control preventivo de gusano cogollero del maíz, productos recomendados2 alternativas.
KARATE ZEON: dosis de 15 cc por 15 litros de agua.
TROYA: 15 cc por 15 litros de agua.
- Puede fertilizar con una manito de UREA a chorro continuo después del riego.
- Fertilizar vía foliar:
ZOBERAMINOL PLUS FOLIAR: dosis de 45 cc por 15 litros de agua.

Nº	USUARIO	SECTOR	RUBRO	FECHA
1	Daniel Gustavo Torres Martin.	San Vicente.	Hortalizas.	11/12/2024

5.4.- Se visita a la usuaria para entregar recomendaciones en producción de hortalizas al aire libre e invernadero.

Usuaria cuenta con plantación de cebollas, maíz choclero, papas y tomates, se realizó un monitoreo recomendando lo siguiente:

- Tomates y papas.
 - Realizar un control de tizón del tomate y papas lo antes posible producto recomendado: METALAXIL: dosis de 30 gramos por 15 litros de agua.
 - Realizar un control de la palomilla y gusano en las papas producto recomendado: NINJA: dosis de 15 cc por 15 litros de agua.
 - Fertilizar des pues del riego, a chorro continuo una manito de urea.
 - Para ayudar al desarrollo vegetativo fertilizar vía foliar con algún bioestimuyente producto recomendado:

ZOBERAMINOL PLUS FOLIAR: 45 cc por 15 litros de agua.
(aplicar cada 15 días vía foliar).

➤ Cebollas:

- Realizar otro control preventivo de tris de la cebolla producto recomendado: NINJA: dosis de 15 cc por 15 litros de agua.
- Desmalezar todas las hileras manualmente para prevenir plagas y enfermedades.
- Maíz choclero:
 - Realizar un control preventivo del gusano cogollero producto recomendado: NINJA: dosis de 15 cc por 15 litros de agua.
 - Para estimular su desarrollo vegetativo puede aplicar vía foliar 2 alternativas:

ZOBERAMINOL PLUS FOLIAR: dosis de 45 cc por 15 litros de agua.
(aplicar cada 10-15 días).

TRAINER: dosis de 75 cc por 15 litros de agua.
(aplicar cada 15 días).

Nº	USUARIO	SECTOR	RUBRO	FECHA
1	Juana Hernández flores.		Autoconsumo	11/12/2024

5.5.- Se visita al usuario para entregar recomendaciones en producción de hortalizas al aire libre. Usuario cuenta con una plantación de tomates, papas, cebollas, se realizó un monitoreo recomendando lo siguiente:

➤ Tomates:

- realizar poda de tomates, cortar el brote que está en la axila de las hojas, dejar un eje central.
- Realizar alambrado- tutorado de tomates, para un buen desarrollo de las plantas.
- Después de poda aplicar un funguicida para el sellado y control de hongos (tizón) producto recomendado:
PHYTON 27: dosis 30-40 cc por 15 litros de agua.
- Fertilizar vía riego:
ULTRASOL INICIAL: 2 kilos por 200 litros de agua.
NITRATO DE CALCIO: 1 kilo por 200 litros de agua.

➤ Papas:

- Realizar un control preventivo del tizón de las papas producto recomendado:
PHYTON 27: 30-40 cc por 15 litros de agua.
- Mantener una pauta de fertilización vía riego producto recomendados:
ULTRASOL PRODUCCION: 3 kilos por 200 litros de agua.
NITRATO DE CALCIO: 1 kilos por 200 litros de agua.
- Realizar un control de palomilla y gusanos producto recomendado:
KARATE ZEON: dosis de 15 cc por 15 litros de agua.

➤ Cebollas:

- Realizar un control preventivo del polvillo producto recomendado:
METALAXIL: 30 gramos por 15 litros de agua.
PHYTON 27: 30-40 cc por 15 litros de agua.
- Realizar un control de trips producto recomendado:
KARATE ZEON: dosis de 15 cc por 15 litros de agua.
- Se recomienda instalar un filtro de malla, para prevenir que se tapen los goteros y las cintas de riego.

Nº	USUARIO	SECTOR	RUBRO	FECHA
1	Javier González Reyes.		Hortalizas.	12/12/2024

5.6.- Se visita a la usuaria para entregar recomendaciones en producción de hortalizas al aire libre.

Usuaria cuenta con plantación de tomates, cebollas y porotos, se realizó un monitoreo recomendando lo siguiente:

➤ Tomates:

- Realizar la poda de los tomates, dejar un solo eje central, cortar los chupones que están en las axilas de las hojas.
- Luego de la poda aplicar un fungicida para el sellado y control preventivo de hongos (tizón), producto recomendado:
METALAXIL: dosis de 30 gramos por 15 litros de agua.
PHYTON 27: 40 cc por 15 litros de agua.
- Realizar alambrado – tutorado para su buen desarrollo.

➤ Cebollas:

- Realizar un control de trips de la cebolla producto recomendado:
KARATE ZEON: dosis de 15 cc por 15 litros de agua.
- Realizar aporca para desmalezar manualmente.
- Realizar un control preventivo de polvillo(mildiu) producto recomendado:
METALAXIL: dosis de 30 gramos por 15 litros de agua.

➤ Porotos:

- Realizar un control preventivo de la polilla del poroto, producto recomendado:
KARATE ZEON: dosis de 15 cc por 15 litros de agua.
TROYA: dosis de 15 cc por 15 litros de agua.
- Aplicar un bioestimulante para un buen desarrollo vegetativo producto recomendado:
ZOBERAMINOL PLUS FOLIAR: 45 cc por 15 litros de agua.
TRAINER: dosis de 75 cc por 15 litros de agua.
- Se recomienda instalar riego tecnificado con cinta de riego para aprovechar más el agua.
- Se recomienda reparar su invernadero lo antes posible o cambiar de posición.

Nº	USUARIO	SECTOR	RUBRO	FECHA
1	Patricia Moreno Fuenzalida		Hortalizas.	12/12/2024

5.7.- Se visita al usuario para entregar recomendaciones en producción de hortalizas al aire libre. Usuario cuenta con plantación de tomates, cebollas porotos, maíz choclero, se realizó un monitoreo recomendando lo siguiente:

➤ Tomates:

- Realizar una buena poda de los tomates, dejar un solo eje central, cortar el chupón que está en las axilas de las hojas.
- Después de la poda aplicar un fungicida para el sellado y control preventivo del tizón del tomate, producto recomendó:
METALAXIL: dosis de 30 gramos por 15 litros de agua.
- Realizar alambrado – tutorado para u mejor desarrollo.
- Realizar un control de araña producto recomendado:
VERTIMEC: dosis de 15 cc por 15 litros de agua.

➤ Cebollas:

- Realizar un control preventivo lo antes posible de trips producto recomendado:
KARATE ZEON: dosis de 15 cc por 15 litros de agua.
- Realizar un control preventivo de polvillo (mildiu).
METALAXIL: dosis de 30 gramos por 15 litros de agua.

➤ Porotos:

- Realizar un control preventivo de la polilla del poroto producto recomendado:
TROYA: 15 cc por 15 litros de agua.
KARATE ZEON: dosis de 15 cc por 15 litros de agua.
- Fertilizar después del riego con una manito de UREA a chorro continuo.

➤ Maíz choclero:

- Realizar un control preventivo de gusano cogollero del choclo producto recomendado:
KARATE ZEON: dosis de 15 cc por 15 litros de agua.
- Puede fertilizar vía foliar toda su producción de hortalizas producto recomendado:
ZOBERAMINOL PLUS FOLIAR: dosis de 45 cc por 15 litros de agua.
TRAINER: dosis de 75 cc por 15 litros de agua.

Nota: se recomienda terminar de armar todo el sistema de riego tecnificado, con cinta de riego, para aprovechar más el agua.

Nº	USUARIO	SECTOR	RUBRO	FECHA
1	Blax Jara Orellana.		Hortalizas.	12/12/2024

6.- Asesoría en frutales mayores.

6.1.- Se visita al usuario para realizar monitoreo a los nogales que fueron injertados durante octubre.

Los cuales fueron 27 nogales que fueron injertados con la variedad Chandler.

Se realizó un monitoreo encontrando algunos de ellos ya brotados en sus púas, para ayudar a un buen desarrollo vegetativo se recomienda realizar lo siguiente:

- Mantener una buena pauta de fertilización:

Vía riego:

UREA: 2 kilos.

ULTRASOL INICIAL- DESARROLLO: 1 kilo.

NITRATO DE CALCIO: 1 kilo.

(Aplicar en 200 litros de agua cada 10 días.)

Vía foliar:

ZOBERAMINOL PLUS FOLIAR: dosis de 30 cc por 15 litros de agua.

(aplicar cada 15 días con bomba espalda sin presión.)

- Para proteger de los rayos solares puede pintar cada nogal con pintura látex agrícola blanco, sin aceite.
- Realizar un riego a capacidad de campo, luego regar todos los días 1 hora 30 minutos, para mantener la humedad.

Nº	USUARIO	SECTOR	RUBRO	FECHA
1	Rosendo Galleguillos Valdenegro.		Frutales Mayores.	03/12/2024

6.2.- Se visita a la usuaria para realizar monitoreo a los nogales que fueron injertados durante octubre.

Se realizó un monitoreo encontrando algunos de ellos ya brotados en sus púas, para ayudar a un buen desarrollo vegetativo se recomienda realizar lo siguiente:

20 nogales fueron injertados con la variedad Chandler.

- Mantener una buena pauta de fertilización:

Vía riego:

UREA: 2 kilos.

ULTRASOL INICIAL- DESARROLLO: 2 kilo.

NITRATO DE CALCIO: 1 kilo.

(Aplicar en 200 litros de agua cada 10 días.)

Vía foliar:

ZOBERAMINOL PLUS FOLIAR: dosis de 30 cc por 15 litros de agua.

(aplicar cada 15 días con bomba espalda sin presión.)

- Para proteger de los rayos solares puede pintar cada nogal con pintura látex agrícola blanco, sin aceite.
- Realizar un riego a capacidad de campo, luego regar 2 horas día por medio, para mantener la humedad.

Nº	USUARIO	SECTOR	RUBRO	FECHA
1	María Matta Núñez.		Autoconsumo	03/12/2024

6.3.- Se visita al usuario para entregar recomendaciones en plantación de limones. Usuario cuenta con una plantación de limones, variedad Génova, con una superficie de 0.2 hectárea, en los cuales se realizó un monitoreo recomendando lo siguiente:

- Realizar una buena pauta de fertilización para mejorar cuajado y calibre de limones vía riego – foliar.

Vía foliar:

MAXIFRUT- FRUTALIV: dosis de 500 cc por 160 litros de agua.
(realizar aplicaciones cada 15 días)

Vía riego:

ULTRASOL PRODUCCION: 3 kilos por 100 litros de agua.
NITRATO DE CALCIO: 1 kilo por 100 litros de agua.

- Realizar un riego a capacidad de campo, luego mantener un riego de 2 horas día por medio.
- Realizar un control de conchuela lo más pronto posible, producto recomendado: TROYA: dosis de 160 cc por 160 litros de agua.
(aplicar cada 7 días 3 aplicaciones.)
- Realizar lavado de plantas con lava loza (detergente, quix), cada 5 días antes de aplicar Troya.
- Realizar un buen control de arañita, producto recomendado: VERTIMEC: dosis de 160 cc por 160 litros de agua.
(aplicar cada 7 días 2-3 aplicaciones.)
- Realizar poda de chupones, brotes secos, un faldeo, colocar pasta poda a todos los cortes para prevenir hongos.

Nº	USUARIO	SECTOR	RUBRO	FECHA
1	Lionel González Solís.		Frutales mayores.	10/12/2024

6.4.-Se visita a la usuaria para entregar recomendaciones en plantación de frutales. Usuaría cuenta con una plantación de 0.2 hectárea de frutales entre (cítricos, ciruelos, perales, damascos, guindos, duraznos.).

Se realizó un monitoreo en ellos recomendando lo siguiente:

- Realizar un riego a capacidad de campo, luego regar todos los días 1 hora para mantener la humedad por la tarde noche.
- Realizar un control preventivo de hongos aplicando algún fungicida que contenga cobre vía foliar, producto recomendado:

FUNGICUP: dosis de 500 gramos por 100 litros de agua.

CALDO BORDELES: dosis de 500 gramos por 100 litros de agua.

- Mantener una buena pauta de fertilización vía riego y foliar para mejorar cuajado y calibre de la fruta:

Vía riego:

ULTRASOL PRODUCCION: 3 kilos por 200 litros de agua.

NITRATO DE CALCIO: 1 kilo por 100 litros de agua.

Vía foliar:

MAXIFRUT- FRUTALIV: 300 cc por 100 litros de agua.

(aplicar cada 15 días.)

- Realizar un control de polilla- gusanos a todos los frutales productos recomendados: 3 alternativas:

TROYA: dosis de 100 cc por 100 litros de agua. (25 días de carencia)

KARATE ZEON – NIJA: dosis de 100 cc por 100 litros de agua. (5 días de carencia).

ZERO: dosis de 50 cc por 100 litros de agua. (12 días de carencia).

Nº	USUARIO	SECTOR	RUBRO	FECHA
1	Mónica Guerrero Soto.		Frutales mayores.	16/12/2024

7.- Asesoría en frutales menores. (frutillas).

7.1.- Se visita al usuario para entregar recomendaciones en plantación de frutillas de primer año. Usuario cuenta con una plantación de frutillas, con una superficie de 0.2 hectárea, variedad san Andrea.

Se realizó un monitoreo recomendando lo siguiente:

- Realizar un control de trips californiano, producto recomendado:
KARATE ZEON: dosis de 200 cc por 200 litros de agua. (5 días de carencia).
SECCES 48: dosis de 20 cc por 200 litros de agua. (1 día de carencia).
- Realizar un control de arañita roja: producto recomendado:
VERTIMEC: 200 cc por 200 litros de agua. (7 días de carencia).
- Mantener una buena pauta de fertilización para mejorar cuajado y engorde de fruta.

Vía riego:

ULTRASOL PRODUCCION FRUTILLA: 3 kilos

NITRATO DE CALCIO: 2 kilos.

PINTA PINTA: 2 kilos.

(aplicar cada 15 días en 200 litros de agua.).

Vía foliar:

MAXIFRUT- FRUTALIV: 500 cc por 200 litros de agua.

HARVEST MORE 55-45: 1 kilo por 200 litros de agua.

KELPAK: 300 cc por 200 litros de agua.

(aplicar los 3 productos juntos cada 15 días).

- Realizar un riego a capacidad de campo, luego mantener la humedad regando 2 horas día por medio.
- Se recomienda cortar todas las frutillas que estén maduras, para ayudar al desarrollo de las otras flores y fruta.

Nº	USUARIO	SECTOR	RUBRO	FECHA
1	Efraín Yáñez Silva.		Frutales menores.	04/12/2024

7.2.- Se visita al usuario para entregar recomendaciones en producción de frutillas. Usuario cuenta con producción de frutillas de primer año, con una superficie de 0.5 hectárea, variedad monterrey, comentar que usuario dejó secar frutillas de segundo año ya que no estaban productivas.

Se realizó un monitoreo en ellas recomendando lo siguiente:

- Realizar control de trips californiano lo más pronto posible productos recomendados:
SUCCES 48: dosis de 20 cc por 20 litros de agua. (1 día de carencia).
KARATRE ZEON: 200 cc por 200 litros de agua. (5 días de carencia).
- Realizar un control de araña roja, productos recomendados:
VERTIMEC: dosis de 200 cc por 200 litros de agua. (7 días de carencia).
KANEMITE: dosis de 120 por 200 litros de agua. (10 días de carencia).
- Realizar una buena pauta de fertilización vía riego- foliar para mejorar cuajado y engorde de la fruta:

Vía riego:

ULTRASOL PRODUCCION: 5 kilos.

NITRATO DE CALCIO: 3 kilos.

PINTA PINTA: 4 kilos.

(aplicar en 200 litros de agua cada 10 días).

Vía foliar:

MAXIFRUT- FRUTALIV: 500 cc por 200 litros de agua.

HARVEST MORE 55-45: 1 kilo por 200 litros de agua.

KELPAK: 300 cc por 200 litros de agua.

(aplicar los 3 productos juntos cada 15 días).

Nº	USUARIO	SECTOR	RUBRO	FECHA
1	Miguel Osorio Pino.		Frutales menores.	11/12/2024

Para el mes de enero se proyecta la realización de las siguientes actividades de terreno con agricultores de la unidad productiva de Prodesal de Litueche:

- Asesoría en frutales.
- Asesoría en producción de frutillas.
- Asesoría en floricultura.
- Asesoría en hortalizas bajo plástico y/o al aire libre.
- Asesoría en avicultura.
- Asesoría en apicultura.
- Asesoría en ganadería.