



## INFORME MES DE JULIO CONVENIO 2024

Nombre:	SEBASTIAN PEREZ OLMEDO
Unidad Operativa:	PRODESAL LITUECHE 1
Nº de Visitas Programadas:	5
Nº de Visitas realizadas:	5

Durante el mes de julio se realizaron las siguientes actividades

### 1.- Asesoría en frutales mayores.

- 1.1. Se visita al usuario para entregar recomendaciones en poda de nogales. Comentar que usuario con una plantación de nogales con 0.2 hectárea, variedad Chandler, las cuales se encuentran con su totalidad de sus hojas caídas.
- Se recomienda realizar la poda lo antes posible:
- Antes y después de poda aplicar cobre para el control preventivo de peste negra productos recomendados:  
CALDO BORDELES: 500 gramos por 100 litros de agua.  
FUNGICUP: 400 gramos por 100 litros de agua.
  - Realizar la poda con buenas tijeras y desinfectadas.
  - Dejar un solo eje central, con 6 a 8 brazos laterales.
  - Eliminar brotes secos, chupones, sierpes, ramas cruzadas.
  - Eliminar las ramas que estén en el interior de la planta para dar luminosidad al interior de la planta.
  - Aplicar en cada corte, con una esponja pasta poda para sellar y prevenir entrada de hongos a la planta.
  - Aplicar vía foliar- riego después de la poda ALIETTE para control de phytophthora dosis de 300 gramos por 200 litros de agua.
  - La producción de esta temporada de nuez fue de 50 kilos aproximado.

Nº	USUARIO	SECTOR	RUBRO	FECHA
1	Marcelino Rubén Reyes Palacios.		Frutales Mayores.	17/07/2024

1.2. Se visita al usuario para entregar recomendaciones en poda de nogales. Usuario cuenta con una plantación de nogales con una superficie de 0.25 hectárea, variedad Chandler.

- Se realizó un monitoreo recomendando podar lo antes posible:
- Realizar aplicaciones de cobre antes y después de la poda para prevención de peste negra productos recomendados:  
FUNGICUP: dosis de 400 gramos por 100 litros de agua.  
CALDO BORDELES: 500 -750 gramos por 100 litros de agua.
- realizar la poda lo antes posible.
- Dejar un solo eje central y unos 6-8 brazos laterales.
- Eliminar chupones, brotes secos, sierpes, ramas secas, ramas cruzadas.
- Realizar rebaje de las plantas, para un buen desarrollo vegetativo de las plantas.
- Despejar al interior de la planta para dar luminosidad al interior de la planta.
- Aplicar en cada corte con una esponja, pasta poda para el sellado y prevención de hongos a la planta.
- Nota: la producción de esta temporada fue de 100 kilos aproximado.

Nº	USUARIO	SECTOR	RUBRO	FECHA
1	Ramón Bahamondez	[REDACTED]	Frutales Mayores.	17/07/2024

## 2.- Asesoría en frutales Menores. (frutillas).

2.1.- Se visita al usuario para entregar recomendaciones en poda de frutillas de primer año. Actualmente usuario cuenta con una plantación de frutillas, con una superficie de 0.2 hectárea, variedad san Andrea.

- Se realizó un monitoreo recomendando lo siguiente:
  - Realizar una poda suave, cortando todas las hojas más viejas de la planta, sin dañar la corona de la planta.
  - Antes y después de la poda realizar un control preventivo de araña y pulgón productos recomendados:  
VERTIMEC: dosis de 200 cc por 200 litros de agua. (araña)  
TROYA: dosis de 200 cc por 200 litros de agua. (pulgón)
  - Este manejo se realiza para rejuvenecer la planta, dar luminosidad de puntos florales, disminuir plagas y enfermedades y una mejor producción en la próxima temporada.
  - Luego de la poda aplicar un fungicida (cobre) para el sellado y control preventivo de hongos. Productos recomendados:  
PHYTON 27: dosis de 300 cc por 100 litros de agua.  
CALDO BORDELES: 1 kilo por 200 litros de agua.  
(aplicación localizada)
  - Pegar maurones, mínimo 2 por planta, bien plantados para una mejor producción.
  - Utilizar para la poda una buena echona afilada y desinfectada con cloro.
  - Retirar todo el sobrante de poda, del camellón para prevención de plagas y enfermedades.
  - Nota: empezar con una buena fertilización a fon de agosto.

Nº	USUARIO	SECTOR	RUBRO	FECHA
1	Efraín Yáñez Silva.		Autoconsumo	19/07/2024

**2.2.-** Se visita al usuario para realizar recomendaciones en poda de frutillas de primer y segundo año. Usuario cuenta actualmente con 1 hectárea de frutillas (0.5 hectárea de primer año y 0.5 de segundo año.) ambas variedades monterrey.

- Se realizó monitoreo recomendando lo siguiente:
  - Realizar antes y después de la poda un control de pulgón y arañita productos recomendados:  
TROTA: dosis de 200 cc por 200 litros de agua. (pulgón)  
VERTIMEC: dosis de 200 cc por 200 litros de agua. (arañita)
  - Se recomienda realizar una poda baja en frutillas de segundo año y una poda suave en frutillas de primer año, sin dañar la corona de la planta.
  - Este manejo se realiza para dar rejuvenecimiento, aumentar la luminosidad de puntos florales y vegetativos, bajar Tasa de emboscamiento, disminuir plagas y enfermedades y tener un mejor fructificación en la próxima temporada.
  - Luego de la poda aplicar un fungicida para el sellado y control de hongos de la planta, productos recomendados:  
PHYTON 27: dosis de 600 cc por 200 litros de agua.  
CALDO BORDELES: 1 kilo por 200 litros de agua.
  - Utilizar desbrozador stihl a su máxima potencia para un corte parejo y limpio.
  - Retirar todo el sobrante de poda del camellón, para prevención de plagas y enfermedades.
  - Realizar una vez por mes, un control preventivo de PHYTOPHTHORA. Producto recomendado:  
ALIETTE 80 % WP: dosis de 300- 400 gramos por 200 litros de agua. (riego y foliar)

Nº	USUARIO	SECTOR	RUBRO	FECHA
1	Miguel Osorio Pino.		Frutales Menores.	25/07/2024

### 3.- Asesoría en Hortalizas.

3.1.- Se vista al usuario para entregar recomendaciones en poda de duraznos, control de cloca y control de plagas y enfermedades en almacigo de tomates:

Se realizó un monitoreo en la plantación de duraznos recomendando lo siguiente:

- Realizar poda de formación, dejar un solo eje central, despejar al centro de la planta para dar luminosidad y más circulación de aire de la planta.
- Cortar chupones, sierpes, ramas secas, cruzadas las que le quitan fuerza a la planta.
- Aplicar pasta poda en cada corte, para el sellado y prevención de entrada de hongos a la planta.
- Realizar controles preventivos de cloca, realizar mínimo 8 aplicaciones por temporada, productos recomendados:  
 OXICRON 50 WWP: dosis de 300- 500 gramos por 100 litros de agua.  
 PHYTON 27: dosis de 300 cc por 100 litros de agua.  
 CALDO BORDELES: 500 gramos por 100 litros de agua.  
 (realizar mínimo 8 aplicaciones por temporada.)

➤ Además, el usuario tiene almacigo de tomates, que en unos días lo trasplantara el cual viene de vivero con polilla del tomate en sus hojas, por lo que se recomienda lo siguiente:

- No plantar plantas muy dañadas.
- Aplicar un insecticida para el control de la polilla producto recomendado:  
 ZERO 5 EC: dosis de 5 cc por 5 litros de agua  
 (realizar aplicación antes de plantar)
- Realizar control preventivo de hongos a la planta y a la tierra, vía riego donde se realizará el plantado de los tomates: productos recomendados:  
 PHYTON 27: dosis de 6 cc por 2 litros de agua. (almacigo)  
 Vía riego: CUPROBORDELES: dosis de 1 kilo por 200 litros de agua.  
 (aplicar vía riego antes de plantar)

Nº	USUARIO	SECTOR	RUBRO	FECHA
1	Rolando Cornejo Cornejo		Hortalizas.	23/07/2024






  
**Sergio Ponce Vargas.**  
Jefe Técnico.

  
**Sebastián Pérez Olmedo**  
Técnico de Terreno.



  
**Francisca Jara Campos.**  
DIDECO.